

Số: /SNN-TSKTTH

Lạng Sơn, ngày tháng 5 năm 2024

V/v chủ động điều tra phát hiện  
và phòng trừ châu chấu tre

Kính gửi: - UBND các huyện, thành phố;  
- Các Chi cục: Trồng trọt và BVTV, Kiểm lâm;  
- Trung tâm Khuyến nông.

Theo Công văn số 1086/UBND-TTBVNN ngày 29/5/2024 của UBND huyện Bình Gia. Hiện nay, trên địa bàn huyện Bình Gia đã xuất hiện châu chấu tre lưng vàng phá hại rừng tre, vầu, nứa, mai với mật độ cao 600-1.000 con/bụi, ăn trụi lá, diện tích phá hại khoảng 10ha. Hiện tại, đang bắt đầu di chuyển từ trên đồi cao xuống các khe suối, bờ bụi và bắt đầu xuất hiện gây hại cây ngô mật độ 50-60 con/m<sup>2</sup> (diện tích 01 ha), châu chấu đang giai đoạn tuổi 3- 4.

Do vòng đời châu chấu tre lưng vàng dài, thời gian sống và phá hại khoảng 5 - 6 tháng trong năm, châu chấu trưởng thành có thể bay xa 40 - 60 km, di chuyển nhanh thành từng đàn và sức tàn phá lớn, rất khó kiểm soát. Khi hết thức ăn trên rừng chúng có thể di chuyển đến phá hại trên các cây trồng khác gần bìa rừng như ngô, lúa, cỏ chăn nuôi... hoặc bay sang các rừng khác. Dự báo, giai đoạn cuối vụ Xuân và vụ Mùa năm 2024, có nguy cơ cao châu chấu phát sinh, lây lan gây hại diện rộng.

Để chủ động phòng chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do châu chấu tre gây ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với các đơn vị trực thuộc ngành thực hiện tốt một số nội dung sau:

### **1. UBND các huyện, thành phố**

- Tăng cường chỉ đạo chuyên môn điều tra, giám sát, dự báo khả năng phát sinh phát triển của châu chấu tre để chủ động phương án phòng trừ, kịp thời khống chế, ngăn chặn ngay từ khi châu chấu mới nở, đặc biệt chú ý những điểm có nhiều xác châu chấu trưởng thành gây hại từ năm trước và khu vực dễ trứng tập trung; theo dõi, xác định vị trí di chuyển của châu chấu tre để có biện pháp phòng chống kịp thời, hiệu quả.

- Tăng cường thông tin tuyên truyền, hướng dẫn nông dân kiểm tra nhằm phát hiện sớm và phòng trừ hiệu quả các ổ dịch châu chấu tre.

- Huy động mọi nguồn lực tại địa phương để diệt trừ châu chấu tre đồng loạt không để gây hại ra diện rộng.

- Sử dụng một trong các loại thuốc trừ châu chấu tre có trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam như: Anvado 100WP,

Lufen extra 100EC, Neretox 95WP... Nồng độ, liều lượng sử dụng theo khuyến cáo trên bao bì.

Lưu ý, việc sử dụng thuốc BVTV phải thực hiện theo nguyên tắc 4 đúng; phun thuốc BVTV đồng loạt, tập trung; trong khu vực phun thuốc tuyệt đối không được chặn, thả gia súc, gia cầm, tránh xa nguồn nước...

- Cập nhật thông tin hàng tuần, thường xuyên báo cáo về Chi cục Trồng trọt và BVTV thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

## **2. Chi cục Trồng trọt và BVTV**

- Phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thành phố, các phòng chuyên môn kiểm tra theo dõi và thông báo kịp thời đến người dân, hướng dẫn tổ chức phòng, trừ có hiệu quả.

- Kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật phòng, trừ và sử dụng thuốc BVTV đến các xã, thị trấn trong công tác chỉ đạo phòng trừ châu chấu tre.

- Hàng tuần tổng hợp báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT để nắm tình hình và chỉ đạo kịp thời.

## **3. Chi cục Kiểm lâm, Trung tâm Khuyến nông**

- Chủ động phối kết hợp với Chi cục Trồng trọt và BVTV trong công tác điều tra phát hiện, phòng chống châu chấu tre.

- Chỉ đạo các Hạt Kiểm lâm, Khuyến nông viên tuyên truyền, hướng dẫn người dân kiểm tra, phát hiện, phòng chống châu chấu tre kịp thời.

Đề nghị UBND các huyện, thành phố, các đơn vị tổ chức triển khai và báo cáo tình hình về Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn để phối hợp xử lý kịp thời./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VT, TSKTTH.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Đinh Thị Thu**